

Nom latin : Lutra lutra
Nom breton : Ki dour (chien d'eau)


Classification

La loutre d'Europe (*Lutra lutra*) fait partie de la famille des mustélidés au même titre que la fouine, la martre, le vison ou encore l'hermine.

Description

La fourrure de la loutre est dense, de couleur brun-marron sur le dos et plus claire sur le ventre et le menton. L'animal mesure environ 1m, pèse entre 5 et 12 kg selon son sexe et sa hauteur au garrot est d'environ 30 cm.

Etant un mammifère adapté à la vie aquatique, la loutre est pourvue de pattes palmées, d'une queue élargie (qui sert de propulseur et de gouvernail), d'yeux qui s'adaptent à la vision sous-marine et enfin de narines et d'oreilles qui se ferment hermétiquement.



Loutre adulte - Photo Erwan Balança





Habitat

Les loutres fréquentent tous les types de milieux aquatiques : cours d'eau, étangs, lacs, marais, milieux saumâtres et même les îles, de préférence riches en végétation sur les berges.

Pour se reposer les loutres utilisent des terriers et des catiches. Ces dernières sont les lieux de reproduction et d'élevage des jeunes. Les exigences envers celles-ci sont donc plus importantes qu'envers les terriers :

- Un maximum de sécurité
- Une bonne vue des environs
- La présence d'eau douce
- Des passages camouflés menant au cours d'eau



Mœurs


La loutre est un prédateur qui peut manger jusqu'à 1,5 kg par jour. Ses repas sont très variés et changent même au cours de l'année, en fonction des ressources du milieu.

Elle est essentiellement nocturne et très méfiante ; il est donc très difficile de l'observer.

La localisation et l'estimation du nombre d'individus se font à partir des indices de présences : empreintes et excréments (appelés **épreintes**- voir photo).

La maturité sexuelle est atteinte à 2 ou 3 ans. La loutre peut se reproduire toute l'année. L'accouplement se fait sous l'eau. La gestation dure 61 à 63 jours mais la femelle n'a qu'une portée par an car la période d'élevage et d'éducation des loutrons est longue (environ 6 mois). Une portée peut comporter jusqu'à 3 loutrons.

Une catiche à loutre




Régime alimentaire

Il est essentiellement composé d'animaux aquatiques, de poissons pour les trois quarts (truites, anguilles, vairons), mais aussi de crustacés, de mollusques, de batraciens, de rongeurs et d'oiseaux d'eau. En fin d'été, elle peut également manger des baies. Tout cela représente une quantité de nourriture équivalente à 10 % de son propre poids avalée chaque jour.

Cependant la réalité est bien plus subtile que cela ! En fait, le régime alimentaire de la loutre varie en fonction de son milieu de vie comme le montre les études réalisées dans trois régions différentes : le Massif Central, la Bretagne et le Marais poitevin (voir schéma ci dessous-).



Comparaison des régimes alimentaires étudiés dans trois régions distinctes



Une épreinte de loutre





Statut et répartition

La loutre est un animal protégé en France depuis 1972. La loutre, commune au début du 20ème siècle, a connu une très nette régression. Jusqu'en 1960, elle était chassée pour sa fourrure. D'autres facteurs sont responsables de la raréfaction de la loutre : la destruction et la modification de l'habitat (artificialisation des côtes et des plans d'eau..), la pollution de l'eau (par les pesticides notamment) et les dérangements causés par la présence de l'homme. En 1986 on estimait qu'il restait environ 1000 individus sur le territoire français (contre 30 000 au début 1900). L'espèce se maintient « bien » dans 10 départements notamment en Bretagne, sur la côte atlantique, en Creuse et Corrèze.

En Europe, la loutre est commune au Portugal, en Irlande et en Ecosse mais elle est rare ou très rare dans beaucoup d'autres pays (notamment en France, en Grande-Bretagne, en Suède et au Danemark).

Elle est très menacée sur toute une zone suivant l'axe Rhône-Rhin (en Hollande, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Autriche et en Italie).

CARTE DE RÉPARTITION DE LA LOUTRE
(d'après C. Bouchardy & Y. Boulade)



Le saviez vous ?

Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la loutre ne concurrence pas les pêcheurs. En Bretagne la plupart de ces proies n'ont que peu d'intérêt pour les pêcheurs. En effet, la loutre privilégie les petits poissons, vairons, loche franche, chabot...

Pour savoir s'il y a des loutres sur ta rivière, tu peux chercher des traces de pas (voir dessin ci-dessous). La patte avant mesure 6 cm x 6 cm et la patte arrière 6 cm x 7 cm.

